

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

| Ingrediente Activo: | % en peso |
|--|-----------|
| Metalaxil metil N-(metoxiacetil)-N-(2,6-xilil)-DL-alaninato (Equivalente a 240 g de I.A./L a 20°C) | 25.30% |
| Disolvente, cosolvente y emulsificante | 74.70% |

TOTAL: 100.00

Fungicida sistémico de la familia Fenilamida, producto formulado para su aplicación en el suelo mediante el sistema de goteo, drench o micro aspersión. Es altamente eficaz contra omicetos (Phytophthoras, peronosporales, Pseudoperonospras, Pythium, Bremia lectucae); actúa interfiriendo la síntesis de ADN, inhibe el crecimiento del micelio, la formación de las esporas y haustorios.

Campo de actividad:

Entre las numerosas enfermedades de origen fúngico que previene y controla destacan las producidas por especies de los géneros Bremia, Peronospora, Phytophthora, Plasmopara, Pseudoperonospora, Pythium y otros peronosporales; entre las especies de mayor interés agronómico cabe citar: ahogamiento o damping off (Pythium sp.), ahogamiento o damping off de las hortalizas (Pythium ultimum), enfermedad de los almácigos (Nectria haematococa), gomosis (Phytophthora citrophthora), gomosis de los cítricos (Phytophthora nicotianae), marchitez del chile (Phytophthora capsici), marchitez sureña (Athelia rolfsii), mildiu de la cebolla (Peronospora destructor), mildiu de la col y de otras crucíferas (Hyaloperonospora [Peronospora] parasitica), mildiu de la vid (Plasmopara viticola), (Phytophthora cinnamomi), etc. en cultivos de chile, jitomate, papa.

| Cultivo | Nombre común | Dosis L/ha | Intervalo de seguridad | Observaciones |
|---------|--|------------|------------------------|--|
| Chile | Marchitez o Damping off <i>Fusarium sp.</i> <i>Phytophthora sp.</i> | 2-4 | 3 | Realizar dos aplicaciones con intervalos de 28 días entre ellas. Las aplicaciones deben ser dirigidas a la base del cuello de las plantas. |
| Tomate | | | 7 | |
| Papa | | | 7 | |

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Mantenganse el producto fuera del alcance de los niños y no transportar ni almacenar juntos a ropa, forrajes o productos alimenticios. Almacenar en lugares frescos y ventilados. Transportarse en vehículos autorizados por la SCT.